Keywords: immunoglobulin G, COVID-19, antibodies, immunological research, immunity.

For citation: Sizova EP, Patyashina MA, Stavropolskaya LV, Badamshina GG, Fatkhutdinova LM. The study of humoral immunity in healthcare workers exposed to COVID-19 patients. *Zdorov'e Naseleniya i Sreda Obitaniya*. 2021; (2(335)):70-74. (In Russian) DOI: <https://doi.org/10.35627/2219-5238/2021-335-2-70-74>

Author information:

✉ Gulnara G. **Badamshina**, Candidate of Medical Sciences, Head, Department for Microbiological Research, Center for Hygiene and Epidemiology in the Republic of Tatarstan; Associate Professor, Kazan State Medical University of the Russian Ministry of Health; e-mail: ggbadamshina@yandex.ru; ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0088-6422>

Elena P. **Sizova**, Head Doctor, Center for Hygiene and Epidemiology in the Republic of Tatarstan; e-mail: fguz@16.rospotrebnadzor.ru; ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6302-3993>

Marina A. **Patyashina**, D.M.Sc., Chief, Department of Rospotrebnadzor for the Republic of Tatarstan; e-mail: rpn.rt@tatar.ru; ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8642-5194>

Lidiya V. **Stavropolskaya**, Candidate of Medical Sciences, Deputy Head Doctor, Center for Hygiene and Epidemiology in the Republic of Tatarstan; e-mail: stavropolskaya2016@yandex.ru; ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5987-5328>

Liliya M. **Fatkhutdinova**, D.M.Sc., Professor, Head of the Department for Hygiene, Occupational Medicine, Kazan State Medical University of the Russian Ministry of Health; e-mail: liliya.fatkhutdinova@gmail.com; ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9506-563X>

Введение. Сложившаяся в настоящее время ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в мире остается напряженной [1–9].

Внимание специалистов здравоохранения обращено на эпидемию COVID-19 вследствие выхода инфекции за пределы допустимого уровня биологического риска [4, 10–12]. На сегодняшний день распространение и прогрессирование заболевания происходит достаточно быстро [5, 13], а наиболее уязвимой профессиональной группой по наличию высокого риска заражения COVID-19 являются медицинские работники (далее – МР) как звено, первично реагирующее на возникновение инфекции.

Защита медицинских работников от заражения COVID-19, мониторинг состояния их здоровья представляют особую актуальность. Вместе с тем в Российской Федерации результаты изучения иммунологической защищенности медицинского персонала освещены недостаточно, вопросы маркеров развития инфекции, диагностики COVID-19, представленные в литературе рядом авторов, преимущественно решаются выявлением РНК SARS-CoV-2 в биоматериале пациентов [1, 3, 7, 8, 11, 14–17].

Целью данной работы явилось изучение состояния гуморального иммунитета по наличию антител класса G к вирусу возбудителя COVID-19 у медицинских работников.

Материалы и методы. Изучение напряженности иммунитета к COVID-19 проведено в рамках оценки популяционного иммунитета к вирусу SARS-CoV-2 согласно письму Роспотребнадзора¹ на базе лабораторий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)». Основную группу обследованных составили 345 медицинских работников, среди которых были обследованы врачи ($45,8 \pm 2,7\%$) и медицинские сестры ($54,2 \pm 2,7\%$) различных специальностей, которые могли контактировать с пациентами с диагнозами новой коронавирусной инфекции. Среди обследованных МР в $83,2 \pm 2,0\%$ случаев были женщины, в $16,8 \pm 2,0\%$ случаев – мужчины.

Средний возраст медицинских работников составил $46,7 \pm 0,7$ года: мужчин – $45,5 \pm 1,8$ года, женщин – $44,3 \pm 0,80$ года; медицинских сестер – $44,2 \pm 0,9$ года, врачей – $48,7 \pm 1,1$ года. Группу сравнения составили инженерно-технический персонал ($n = 72$), сопоставимый по возрасту (средний возраст – $43,4 \pm 1,3$ года) и

полу (мужчины – $16,7 \pm 4,4\%$ обследованных (средний возраст – $43,7 \pm 3,5$ года), женщины – $83,3 \pm 4,4\%$ обследованных (средний возраст – $44,2 \pm 1,5$ года).

Напряженность иммунитета к COVID-19 у МР изучена методом иммуноферментного анализа с использованием коммерческих наборов реагентов «Набор реагентов для анализа сыворотки крови человека на наличие специфических иммуноглобулинов класса G к нуклеокапсиду вируса SARS-CoV-2 методом иммуноферментного анализа» производства ФБУН «Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии» Роспотребнадзора (г. Оболенск)².

Оценка напряженности иммунитета у медицинских работников проведена на основе измерения оптической плотности контрольного и испытуемых образцов на спектрофотометре (анализаторе иммуноферментного микропланшетном автоматическом Infinite F50, Tecan Austria GmbH, (Австрия)) при длине волны 450 нм, расчете значения cut off согласно формуле, указанной в инструкции к тест-системе, и в соответствии с письмом ФБУН «Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии» Роспотребнадзора³. Диагностически значимым на наличие антител Ig G к вирусу SARS-CoV-2 считался образец, если соответствующее ему значение оптической плотности было больше или равно пороговому значению методики (cut off). В данной работе для количественного описания уровня антител и наличия антител у МР использовался индекс позитивности (ИП), представляющий собой отношение оптической плотности образца к пороговому значению методики (cut-off level). Пробы, в которых значения ИП превышали пороговое значение методики, были отнесены к положительным (диагностически значимым) пробам на наличие антител IgG к вирусу SARS-CoV-2.

Для обработки полученных результатов использованы общепринятые методы параметрической и непараметрической статистики. Для сравнения абсолютных значений применен t-критерий Стьюдента; для относительных величин – критерий χ^2 с поправкой Йетса на непрерывность. Различия считались достоверными при значении $p < 0,05$.

Результаты. По данным проведенных иммунологических исследований установлено, что в группе медицинских работников средний

¹ Письмо Роспотребнадзора от 19.06.2020 № 02/125-2020-27.

² Серия 04 (дата изготовления 04.2020, РУ № РЗН 2020/10268 от 08.05.2020).

³ Письмо от 23.07.2020 № 150-50/1-04-1370-2020.

Таблица 4. Показатели индекса позитивности антител IgG к вирусу SARS-CoV-2 у основной группы и группы сравнения по возрастам

Table 4. SARS-CoV-2 IgG antibody response index values in the study participants by age

№	Обследованные / Examined subjects	Показатель / Indicator	Возраст, годы / Age, years					
			20–29	30–39	40–49	50–59	60–69	70–79
1	Медицинские работники / Healthcare workers	<i>n</i>	46	88	85	74	39	13
		<i>M</i> ± <i>m</i> , у.е. / с.у.	0,8 ± 0,08	1,0 ± 0,1	1,2 ± 0,2	1,3 ± 0,2	1,1 ± 0,3	1,0 ± 0,2
		<i>σ</i> , у.е./ с.у.	0,6	1,0	1,8	1,3	1,8	0,6
		% ± <i>m</i>	21,7 ± 1,3	37,2 ± 5,2	34,1 ± 5,1	48,7 ± 5,8	33,3 ± 7,5	46,5 ± 14,4
2	Группа сравнения / Comparison group	<i>n</i>	5	25	20	13	8	0
		<i>M</i> ± <i>m</i> , у.е./ с.у.	0,9 ± 0,3	0,9 ± 0,2	1,1 ± 0,2	1,1 ± 0,2	1,2 ± 0,2	–
		<i>σ</i> , у.е./ с.у.	0,6	1,0	0,4	0,7	0,6	–
		% ± <i>m</i>	40,0 ± 24,5	20,0 ± 8,2	15,0 ± 8,2	38,5 ± 14,0	62,6 ± 18,3	–

Примечание: % – удельный вес лиц, со значениями индекса позитивности, превышающими индекс позитивности контролей.

Note: % – the proportion of individuals with IgG antibody response index values exceeding those of controls.

манипуляции), имеет больший риск инфицирования SARS-CoV-2.

Согласно мнению исследователей, IgG к вирусу SARS-CoV-2 в сыворотке крови появляются в результате встречи организма с возбудителем, в результате которой происходит нарастание клинической симптоматики или бессимптомное носительство [18–20]. Наличие у $37,1 \pm 2,6\%$ МР антител данного класса может являться следствием как перенесенной инфекции, так и бессимптомного носительства у обследованного медицинского персонала, что требует дальнейшего изучения. Величина реакции антител, по мнению ряда авторов, может коррелировать с тяжестью заболевания [16].

Согласно общепринятому мнению о механизмах иммунного ответа к вирусным инфекциям [16, 18, 21], для медицинских работников, у которых выявлены антитела IgG к вирусу SARS-CoV-2, можно было бы предположить наличие защитного иммунитета к коронавирусной инфекции, однако данный вопрос требует дальнейшего исследования [22]. Тем не менее, в текущей эпидемиологической ситуации выявление антител IgG к вирусу SARS-CoV-2 может быть использовано для принятия решения о распределении обязанностей среди медицинского персонала [11, 12]. Продолжительность защиты лиц, имеющих антитела, на сегодняшний день неизвестна [11, 19, 23–30].

Выводы. По данным иммунологических исследований на наличие антител Ig G к вирусу SARS-CoV-2 установлено, что средний уровень индекса позитивности у медицинских работников достоверно выше по отношению к группе сравнения. У медицинских сестер наличие антител IgG к вирусу SARS-CoV-2 выявлено достоверно чаще, чем у врачей и лиц из группы сравнения, при этом диагностически значимый уровень ИП антител IgG к вирусу SARS-CoV-2 в этой профессиональной группе встречался чаще, чем в группе сравнения.

Информация о вкладе авторов: Е.П. Сизова – изучение обзора литературы, формирование цели, задач исследования, организация исследования, обобщение полученных результатов; М.А. Пяташина – организация исследования, обобщение полученных результатов, написание выводов; Л.В. Ставропольская – изучение актуальности исследования, организация исследования, обобщение полученных результатов; Г.Г. Бадамшина – изучение обзора литературы, формирование цели, задач исследования, организация

исследования, проведение исследования, статистическая обработка, построение таблиц, обобщение полученных результатов, написание выводов, перевод статьи; Л.М. Фатхутдинова – изучение обзора литературы, формирование цели, задач исследования, построение таблиц, обобщение полученных результатов, написание выводов, перевод статьи.

Финансирование: исследование не имело спонсорской поддержки.

Конфликт интересов: авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Соблюдение правил биоэтики: все участники исследования подписали согласие на участие в исследовании. Пациенты подписали информированное согласие на публикацию данных.

Список литературы (пп. 3, 7–11, 13, 15–20, 22–30 см. References)

- Хегай С.В., Джапарова А.К., Дуйшеналиева Э.М., и др. Молекулярная диагностика коронавирусной инфекции в Кыргызской Республике // Проблемы особо опасных инфекций. 2020. № 2. С. 141–143.
- Рахманова Д.Н. Клинические особенности коронавирусной инфекции // Вестник науки. 2020. Т. 3. № 7 (28). С. 104–108.
- Романов Б.К. Коронавирусная инфекция COVID-2019 // Безопасность и риск фармакотерапии. 2020. Т. 8. № 1. С. 3–8.
- Санникова Н.Р., Тетерина А.Д., Железнова А.Д. Клинические особенности коронавирусной инфекции COVID-19 // Медицинское образование сегодня. 2020. № 3 (11). С. 181–190.
- Колодкина Е.В., Бакулина Е.А., Беккер Е.Д. Этиология коронавирусной инфекции // Медицинское образование сегодня. 2020. № 3 (11). С. 157–164.
- Колодкина Е.В., Латышко О.В. Патогенез коронавирусной инфекции // Медицинское образование сегодня. 2020. № 3 (11). С. 165–173.
- Никифоров В.В., Суранова Т.Г., Чернобровкина Т.Я. и др. Новая коронавирусная инфекция (COVID-19): клинко-эпидемиологические аспекты // Архив внутренней медицины. 2020. Т. 10. № 2 (52). С. 87–93.
- Бегова М.Р., Нетесов С.В., Аульченко Ю.С. Новая коронавирусная инфекция COVID-19 // Молекулярная генетика, микробиология и вирусология. 2020. Т. 38. № 2. С. 51–58.

References

- Khgay SV, Dzhaparova AK, Dushenalieva EM, et al. Molecular diagnostics of coronavirus infection in the Kyrgyz Republic. *Problemy Osobo Opasnykh Infektsiy*. 2020; (2):141–143. (In Russian). DOI: <https://doi.org/10.21055/0370-1069-2020-2-141-143>

2. Rakhmanova DN. [Clinical features of coronavirus infection.] *Vestnik Nauki*. 2020; 3(7(28)):104–108. (In Russian).
3. Chernyshova LI. Coronavirus disease (lecture). *Aktual'naya Infektologiya*. 2020; 8(2):6–9. (In Ukrainian). DOI: <https://doi.org/10.22141/2312-413x.8.2.2020.199729>
4. Romanov BK. Coronavirus disease COVID-2019. *Bezopasnost' i Risk Farmakoterapii*. 2020; 8(1):3–8. (In Russian). DOI: <https://doi.org/10.30895/2312-7821-2020-8-1-3-8>
5. Sannikova NR, Teterina AD, Zheleznova AD. Clinical features of coronavirus infection COVID-19. *Meditsinskoe Obrazovanie Segodnya*. 2020; (3(11)):181–190. (In Russian).
6. Kolodkina EV, Bakulina EA, Bekker ED. Etiology of coronavirus infection. *Meditsinskoe Obrazovanie Segodnya*. 2020; (3(11)):157–164. (In Russian).
7. Zhai P, Ding Y, Wu X, et al. The epidemiology, diagnosis and treatment of COVID-19. *Int J Antimicrob Agents*. 2020; 55(5):105955. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ijantimicag.2020.105955>
8. Long QX, Liu BZ, Deng HJ, et al. Antibody responses to SARS-CoV-2 in patients with COVID-19. *Nat Med*. 2020; 26(6):845–848. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41591-020-0897-1>
9. Lee C, Lin R, Renia L, et al. Serological approaches for COVID-19: Epidemiologic perspective on surveillance and control. *Front Immunol*. 2020; 11:879. DOI: <https://doi.org/10.3389/fimmu.2020.00879>
10. Wang B, Wang L, Kong X, et al. Long-term coexistence of SARS-CoV-2 with antibody response in COVID-19 patients. *J Med Virol*. 2020; 92(9):1684–1689. DOI: <https://doi.org/10.1002/jmv.25946>
11. Patel R, Babady E, Theel ES, et al. Report from the American Society for Microbiology COVID-19 International Summit, 23 March 2020: Value of Diagnostic Testing for SARS-CoV-2/COVID-19. *mBio*. 2020; 11(2):e00722–20. DOI: <https://doi.org/10.1128/mBio.00722-20>
12. Kolodkina EV, Latyshko OV. Pathogenesis of coronavirus infection. *Meditsinskoe Obrazovanie Segodnya*. 2020; (3(11)):165–173. (In Russian).
13. Shen L, Wang C, Zhao J, et al. Delayed specific IgM antibody responses observed among COVID-19 patients with severe progression. *Emerg Microbes Infect*. 2020; 9(1):1096–1101. DOI: <https://doi.org/10.1080/22221751.2020.1766382>
14. Nikiforov VV, Suranova TG, Chernobrovkina TYu, et al. New coronavirus infection (Covid-19): Clinical and epidemiological aspects. *Arkhiv Vnutrenney Meditsiny*. 2020; 10(2):87–93. (In Russian). DOI: <https://doi.org/10.20514/2226-6704-2020-10-2-87-93>
15. Pancrazzi A, Magliocca P, Lorubbio M, et al. Comparison of serologic and molecular SARS-CoV 2 results in a large cohort in Southern Tuscany demonstrates a role for serologic testing to increase diagnostic sensitivity. *Clin Biochem*. 2020; 84:87–92. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.clinbiochem.2020.07.002>
16. Özçürümez MK, Ambrosch A, Frey O, et al. SARS-CoV-2 antibody testing – questions to be asked. *J Allergy Clin Immunol*. 2020; 146(1):35–43. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jaci.2020.05.020>
17. Zhang L, Pang R, Xue X, et al. Anti-SARS-CoV-2 virus antibody levels in convalescent plasma of six donors who have recovered from COVID-19. *Aging (Albany NY)*. 2020; 12(8):6536–6542. DOI: <https://doi.org/10.18632/aging.103102>
18. Mathur G, Mathur S. Antibody testing for COVID-19. *Am J Clin Pathol*. 2020; 154(1):1–3. DOI: <https://doi.org/10.1093/ajcp/aqaa082>
19. Chowdhury MA, Hossain N, Kashem MA, et al. Immune response in COVID-19: A review. *J Infect Public Health*. 2020; 13(11):1619–1629. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jiph.2020.07.001>
20. Paces J, Strizova Z, Smrz D, et al. COVID-19 and the immune system. *Physiol Res*. 2020; 69(3):379–388. DOI: <https://doi.org/10.33549/physiolres.934492>
21. Bevova MR, Netesov SV, Aulchenko YuS. New coronavirus infection COVID-19. *Molekulyarnaya Genetika, Mikrobiologiya i Virusologiya*. 2020; 38(2):51–58. (In Russian). DOI: <https://doi.org/10.17116/molgen20203802151>
22. Altmann DM, Douek DC, Boyton RJ. What policy makers need to know about COVID-19 protective immunity. *Lancet*. 2020; 395(10236):1527–1529. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30985-5](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30985-5)
23. Randolph HE, Barreiro LB. Herd immunity: Understanding COVID-19. *Immunity*. 2020; 52(5):737–741. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.immuni.2020.04.012>
24. Kadkhoda K. COVID-19: an immunopathological view. *mSphere*. 2020; 5(2):e00344–20. DOI: <https://doi.org/10.1128/mSphere.00344-20>
25. Kang H, Wang Y, Tong Z, et al. Retest positive for SARS-CoV-2 RNA of “recovered” patients with COVID-19: Persistence, sampling issues, or re-infection? *J Med Virol*. 2020; 92(11):2263–2265. DOI: <https://doi.org/10.1002/jmv.26114>
26. Shi Y, Wang G, Cai XP, et al. An overview of COVID-19. *J Zhejiang Univ Sci B*. 2020; 21(5):343–360. DOI: <https://doi.org/10.1631/jzus.B2000083>
27. Lotfi M, Hamblin MR, Rezaei N. COVID-19: Transmission, prevention, and potential therapeutic opportunities. *Clin Chim Acta*. 2020; 508:254–266. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.cca.2020.05.044>
28. Asselah T, Durantel D, Pasmant E, et al. COVID-19: Discovery, diagnostics and drug development. *J Hepatol*. 2021; 74(1):168–184. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jhep.2020.09.031>
29. Rodriguez Y, Novelli L, Rojas M, et al. Autoinflammatory and autoimmune conditions at the crossroad of COVID-19. *J Autoimmun*. 2020; 114:102506. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jaut.2020.102506>
30. Brüssow H. Immunology of COVID-19. *Environ Microbiol*. 2020; 22(12):4895–4908. DOI: <https://doi.org/10.1111/1462-2920.15302>

Статья получена: 18.01.21
 Принята в печать: 03.02.21
 Опубликовано: 26.02.21